



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 22 de juny de 2018
Avís 36/2018

Cultius:

Vinya, olivera, cirerer, ametller, avellaner, fruiters de pinyol, cítrics i horta

Vinya

Cuc del Raïm: Segona generació

Moments de tractament i productes:

Inici de vol: fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: clorantraniprol, indoxacarb i metoxifenocida.

Inici d'eclosió: *Bacillus thuringiensis*, emamectina, spinosad, spinetoram i tebufenocida.

Màxima eclosió: metil clorpirifos

• **Baix Penedès:**

– **A la zona més primerenca que és la costanera** de Calafell i El Vendrell, la màxima eclosió és des de divendres 22 fins dilluns 25.

– **A la zona interior** com l'Arboç, La Bisbal, Sant Jaume, Albinyana, Bellvei i Banyeres, l'inici de l'eclosió és dissabte 23 i diumenge 24. La màxima eclosió serà dimarts 26, dimecres 27 i dijous 28

• **Camp de Tarragona:**

– **A la zona primerenca** de Constantí i Cambrils l'inici d'eclosió dels ous és divendres 22, dissabte 23. La màxima eclosió serà dilluns 25, dimarts 26 i dimecres 27

– **A les zones mitjanes** de Vallmoll, Nulles, La Secuita, Bràfim, Vilabella, l'inici de l'eclosió és diumenge 24 i dilluns 25.

– **A les zones tardanes:** com parts altes de Valls, Fontscaldes, parts baixes de Vila-rodona, del Pont d'Armentera, del Pla de S^a Maria, Rodonyà, Masllorç, s'ha iniciat la posta dels ous.

• **Priorat DO Montsant:**

– **A les zones primerenques** com Garcia, Darmós, zones baixes dels Guiamets, del Masroig i del Molar l'inici de l'eclosió dels ous és divendres i dissabte dies 22 i 23. La màxima eclosió serà dilluns 25, dimarts 26 i dimecres 27

– **A les zones mitjanes** com zones altes dels Guiamets, del Masroig, del Molar, La Serra d'Almós, Capçanes, Marçà, Falset, Pradell de la Teixeta i La Torre de Fontaubella, l'inici de l'eclosió és dilluns 25 i dimarts 26.

– **A les zones tardanes** de Cabacés, La Figuera, Margalef i La Bisbal s'ha iniciat la posta dels ous.

– **A la zona més tardana** de Cornudella i Ulldemolins s'ha iniciat el vol.

• **Priorat DOQ Priorat**

– **A les zones primerenques** com Bellmunt, Lloar i El Molar, estem en període de posta dels ous.

– **A la zona mitjana** com Gratallops, Vilella Alta i Baixa, Torroja, s'ha iniciat la posta dels ous.

– **A la zona tardana** Porrera, Poboleda, Scala Dei, la Morera i els masos de Falset limítrof amb Porrera s'ha iniciat el vol.

- **Conca de Barberà:**

– **A les zones primerenques** com Montblanc, Pira i Barberà s'ha iniciat el vol.

Mildiu

De moment no es preveuen noves pluges durant aquesta setmana, per tant, cal estar atents a la presència de taques o raïms afectats.

Cendrosa

Estem trobant incidència de cendrosa en molts indrets. Recordem que el tercer tractament cal fer-lo quan el gra del raïm arriba a la mida d'un pèsol.

NOTA: Per a obtenir bones eficàcies, en tots els casos els tractaments s'han de fer fila per fila, passant per les dues cares dels ceps

Olivera

Prays oleae

A la zona del Baix Penedès comencen a observar-se penetracions de les larves en els fruits. Es recomana iniciar el tractament des d'avui fins el dimecres 27.

Cirerer

Drosophila suzukii

Segueixen apareixent danys. Protegiu aquelles varietats que es trobin en maduració, ja que és el període de màxima susceptibilitat.

Avellaner

Diabló

Part baixa del camp de Tarragona: A les finques afectades amb més de 4 diablons/100 cops, es recomana realitzar el segon tractament contra la picada de posta a partir de dilluns dia 18

Zones tardanes de muntanya: A les finques afectades es recomana realitzar el primer tractament per protegir contra la picada alimentícia

Aranya

Cal estar atents als primers símptomes a les plantacions

Fruiters de pinyol:

Mosca de la fruita o ceratitis

En fruiters sensibles com albercoc, préssec i nectarina, ja estem detectant presència de mosca i algun fruit picat. Cal doncs protegir la fruita un cop inicií el període de maduració prestant atenció al termini de seguretat.

Préssec i nectarina

Pugó verd

Vigileu si s'observen colònies de pugó a les brostades.

Cendrosa

Recordem que cal protegir el fruit, especialment en les varietats sensibles, des de caiguda de collarí fins enduriment de pinyol.

Cítrics:

Poll roig de Califòrnia

Es recomana realitzar un tractament contra la primera generació a tots aquells agricultors que van detectar més d'un 2% de fruits ocupats (més de 3 escuts) durant la collita passada.

Poll gris

Durant el mes de juny es produeix el màxim de formes sensibles. Si a la parcel·la hi ha poll roig, el tractament contra aquesta plaga també controlaria el poll gris. Si no existeix poll roig i es supera el llindar de tractament (més d'un 2% de fruits ocupats durant la collita passada), la primera meitat de juny, va ser el moment idoni per fer el tractament de la primera generació.

Horta

Ceba i Patata: *Míldiu*

Vigileu les plantacions i protegiu en cas de ser necessari.

Tomaquera a l'aire lliure

Tuta absoluta

Les poblacions a l'aire lliure són molt baixes. Amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis*, respectuós amb els enemics naturals que colonitzen el cultiu de forma natural.

Patata

Escarabat de la patata

Quan s'observi un 20% de plantes ocupades per qualsevol estadi (ou, larva o adult) d'aquesta plaga s'ha de realitzar el tractament.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona.

Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)

Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45

<http://www.gencat.cat/daam>

ssv.t.daam@gencat.cat