

Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Vilafranca del Penedès

Avís del 16 d'agost de 2018
35/2018

Vinya, olivera i fruiters

Vinya

Xarxa d'Avisos Antimíldiu

Durant el mes d'agost és recomanable realitzar algun tractament amb coure per tal de prevenir l'aparició del míldiu de tardor i evitar la caiguda anticipada dels pàmpols, principalment aquest any en que hi ha gran quantitat d'inòcul.

A les varietats més primerenques es pot optar per fer el tractament just després de la verema.

Aquest tractament és especialment important en vinyes joves en formació, que s'han de protegir fins el final del cicle vegetatiu.

Corc del raïm

Zones tardanes: La Llacuna, Mediona, Pontons, etc.

S'ha iniciat la posta de la tercera generació, ja poden aplicar-se els productes Clorantraniliprol, Indoxacarb i Metoxifenocide.

Les matèries actives autoritzades i recomanades actualment en la lluita contra el corc del raïm tenen els següents moments d'aplicació:

Moment d'aplicació	Matèria activa	Marca comercial
Inici del vol	Fenoxicarb	INSEGAR
Entre inici de vol i inici d'eclosió	Clorantraniliprol	CORAGEN
	Indoxacarb	STEWART, EXPLICIT
	Metoxifenocide	RUNNER, INTREPID
Inici d'eclosió	Bacillus thuringiensis (1)	Diverses
	Emamectina (2)	AFFIRM
	Spinosad (1)	SPINTOR
	Spinetoram	RADIANT
	Tebufenocide	MIMIC
Màxima eclosió	Metil clorpirifos (2) (3)	

1: Autoritzat en agricultura ecològica. 2: Autoritzat el seu ús fins setembre de 2018.

3: Només formulacions autoritzades per vinya.

Malura o cendrosa

A partir del verolat no cal renovar els tractaments. En aquelles vinyes que es trobin lluny de la maduració, caldrà seguir protegint només allà on s'observi presència de malura als raïms.

Olivera

Mosca de l'oliva

El nivell de picada global és encara molt baix, però en algunes finques localitzades ja s'assoleix el llindar d'atac. Es recomana observar les oliveres i tractar només si es supera el 5% d'olives amb picada nova.

Presseguer i nectarina

Mosca de la fruita o Ceratitis

El nivell d'incidència que s'observa durant aquesta campanya és, de moment, molt baix. De tota manera, a les zones on no s'aplica la lluita mitjançant captura massiva, es recomana protegir les varietats a partir que iniciïn el període de maduració, especialment en aquelles finques on s'observin préssecs picats.

Recordem que cal respectar els terminis de seguretat dels productes utilitzats entre el tractament i la collita.

Un cop acabada la collita és important que no quedin restes de fruita, ja que actuen com a reservori de la plaga. Cal tirar a terra tota la fruita de rebuig i retirar-la o bé triturar-la amb una picadora.

Aranya roja

En alguns llocs comencen a pujar les poblacions. Tracteu només en el cas que localitzeu algun focus.

Mosquit verd

Cal observar les plantacions joves en formació i tractar si observeu presència d'aquesta cicadel·la.

Informació elaborada amb la col·laboració de les Agrupacions de Defensa Vegetal.

Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Enllaços d'interès:

[Full informatiu sobre la mosca de l'oliva.](#)

Informació facilitada per l'informador automàtic de Vilafranca del Penedès (93 890 06 59)

Plaça Àgora, s/n. 08720 Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 05 34

sanitatvegetal.vila.daam@gencat.cat

Si voleu donar-vos de baixa d'aquest servei, respongueu aquest correu indicant BAIXA.